

허가사항 변경지시(안)

메로페넴 주사제

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 ~ 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (생략)
3. 이상반응
 - 1) 쇼크 ~ 8) 호흡기계 (생략)
 - 9) 피부 : 중독성 표피괴사용해(리엘증후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 호산구증 및 전신증상을 동반한 약물반응(DRESS 증후군), 다형홍반, 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부반응이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 10) ~ 17) (생략)

(이하 생략)

메로페넴 허가사항 변경대비표

기 허가사항	변경사항
<p>3. 이상반응 1) ~ 8) (생략) 9) 피부 : 다른 카바페넴계 항생물질에서 드물게 중독성 표피괴사용해(리엘증후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군)이 (추가) 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.</p> <p>10) ~ 17) (생략)</p>	<p>3. 이상반응 1) ~ 8) (생략) 9) 피부 : 중독성 표피괴사용해(리엘증후군), 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), <u>호산구증 및 전신증상을 동반한 약물반응(DRESS 증후군), 다형홍반, 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)</u>과 같은 중증 피부반응이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.</p> <p>10) ~ 17) (생략)</p>